

アロハ保育園 予防接種チェック表

なまえ：

生年月日：

ワクチン	回数	接種日	推奨月齢など
Hib (インフルエンザ菌B型)	①	2 0 / /	2か月から それぞれ27-56日 (4-8週) あける
	②	2 0 / /	
	③	2 0 / /	
	追加	2 0 / /	1歳を超えたら
小児肺炎球菌 (PCV13)	①	2 0 / /	2か月から それぞれ27-56日 (4-8週) あける
	②	2 0 / /	
	③	2 0 / /	
	追加	2 0 / /	1歳から1歳3か月
B型肝炎	①	2 0 / /	生後2か月
	②	2 0 / /	生後3か月
	③	2 0 / /	生後7~8か月
四種混合 (DPT-IPV) (ジフテリア、百日せき、 破傷風、ポリオ)	①	2 0 / /	それぞれ20-56日 (3-8週) あける
	②	2 0 / /	
	③	2 0 / /	
	追加	2 0 / /	3回目以降6か月以上あける。 標準的には12-18か月の間に接種
ロタウイルス	①	2 0 / /	生後6週から
	②	2 0 / /	①は8週~15週未満を推奨 4週以上あけて2回以降接種
	③	2 0 / /	※2回で終了する種類の場合は③を消してください。
BCG (結核)		2 0 / /	12か月未満に接種標準的には5~8か月未満
麻しん・風しん (MR)	①	2 0 / /	1歳以上2歳未満
	②	2 0 / /	5歳以上7歳未満小学校入学前の1年間
水痘	①	2 0 / /	生後12-15か月
	②	2 0 / /	1回目から6-12か月あける
日本脳炎	①	2 0 / /	3歳 6-28日 (1-4週) あける
	②	2 0 / /	
	追加	2 0 / /	4歳 2回目から1年あける
		2 0 / /	
		2 0 / /	
		2 0 / /	